



图 2 微机测压图例

4 应用

可测面瘫累及唇之程度及治疗恢复情况;可测舌麻痹程度及治疗恢复情况;为食道发音提供参考数据;可测返流性食管炎、裂孔疝、食道松弛症、食道痉挛及神经系统引起的食管功能改变的压力情况以协助诊断及判断治疗恢复情况;可测 X 光不能发现的食道功能改变,如硬皮病、系统性红斑狼疮、糖尿病、多发性肌皮病、老年肌强直、中枢疾病、肌萎缩、震颤麻痹引起的食功能障碍。

(此装置已通过鉴定,并获专利权。专利号为:Z.L 93.2 08082.0)

(1993-12-25 收稿,1994-06-20 修回,责编 张瑞军)

柳白液治疗慢性外阴营养不良 36 例

武警四川总队乐山医院妇产科 胡金枝 (乐山 614000)

1985~1992 年,我院采用 10%柳酸酒精白鲜皮液(简称柳白液)治疗慢性外阴营养不良,效果良好,报告如下。

1 临床资料

慢性外阴营养不良 36 例,其中增生型营养不良 4 例,硬化苔癣型营养不良 7 例,混合型营养不良 25 例。病变区波及大小阴唇、阴蒂包皮、尿道口周围、会阴及肛门周围,病变区面积均在 6cm×4cm 左右。

2 治疗方法

2.1 处方 用 10%柳酸酒精 500 ml,将干白鲜皮 100 g 浸泡 3 d 后即可使用。

2.2 方法 用温开水洗净外阴后,再用棉签沾柳白液涂擦患处 1 次/d,直至皮肤恢复正常形态。临床治愈后可间断搽柳白液巩固治疗。在搽药时,防止柳白液浸入皲裂处、尿道口内以免引起刺痛。

2.3 疗效判定标准 治愈:搔痒症状消失,皮肤、粘膜恢复正常形态;好转:搔痒症状消失,皮肤、粘膜变为粉红,弹性好,病变区皮肤、粘膜大部分恢复正常;无效:用药后无变化。

3 结果

患处搽柳白液后搔痒即止。每隔 4~6 d 脱皮 1 次,经反复脱皮,病变区逐渐缩小,最后消失。36 例中,治愈 33 例,好转 3 例,经临床观察病变区反复搽柳白液后未见糜烂等反映。

4 讨论

慢性外阴营养不良病因不明,近年来认为局部血管神经营养失调可能是本病的发病因素^[1]。也有人认为真皮中存在一种能抑制表皮细胞分裂生长的抑素,造成局部结缔组织增生和表皮代谢失调所致。主要症状为外阴奇痒难忍,局部湿疹样改变,病变区变白增厚隆起或变薄易皲裂,外阴多萎缩。以往多采用手术治疗,复发率高^[2]。目前虽然采用多种药物治疗,但效果不佳。柳白液中的白鲜皮外用可抗真菌和抑制多种皮肤病^[3]。10%柳酸酒精能杀灭寄生于皮肤深部的霉菌。能治疗匍行疹和皮肤角化皲裂、顽癣等皮肤病^[4],并且止痒迅速,能脱去表皮,从而调节神经和上皮的营养代谢,达到控制局部搔痒,使外阴皮肤、粘膜恢复正常形态的目的。经临床应用此药止痒迅速,治愈率高,价格低廉,值得推广。

5 参考文献

- 南充医学专科学校主编. 妇产科学. 北京:人民卫生出版社,1981. 251~253.
- 王淑贞主编. 实用妇产科学. 北京:人民卫生出版社,1987. 936~938.
- 广州军区卫生部,广东省卫生局,湖南省卫生局,等编写. 新编中医学概要. 北京:人民卫生出版社 1973. 174.
- 李德才主编. 新简明药物手册. 吉林:人民出版社,1983. 174.

(1993-12-17 收稿,1994-04-10 修回,责编 张瑞军)